Terret noir

14MTP5

INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s476-480
14Mtp5

Terret noir
2R2P 476-480

Terret noir
Vass2R02s476-480









DESIGNATION Terret noir.
CLOS V PLANCHE 12 RANG A Souche 4

Vigueur : 3
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison : 7.8.73
Date de Maturité : 24.9.73 x
Pourriture : 1 le 7.9. +6
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 20x19
disc. - ~~sph.~~ - (ell.) lég. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 5
s2 6
s3 5
s4 6
s5 8

avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

---

oo1405 Te

DESIGNATION Terret noir
CLOS V PLANCHE 12 RANG A souche 4

Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 17.8.72 X
Date de Maturité : 25.9.72 +6
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 18x17
disc. - sph. - (ell.) lég. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 2
s2 10
s3 6
s4 2
s5 8

avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

Témoin

DESIGNATION Terret
CLOS V PLANCHE 12 RANG A souche 4

Vigueur : 2,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5.8.71 +6
Date de Maturité : 27.9.71 X
Pourriture : 0,5 (16.9)
GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - (M) - P 18x17
disc. - (sph.) ov - (ell.) lég. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 5
s2 7
s3 5
s4 2
s5 0

avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Terret noir
CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 2,5 Témoin
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 27.7.70
Date de Maturité : 21.9. +6
Pourriture : 0 le 12.9.70
GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 19x17 - P
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - a r - fox - herb
CHARGE :

s 11
s 28
s 34
s 43
s 58

avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

Terret DESIGNATION Terret noir
CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : E - M - (C)
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 12.8
Date de Maturité : 29-9.69 +6
Pourriture : 0,5 15
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 21X14
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 14
s 29 avec (pépins) - apyrène
s 36 JUS : (inc). - coloré
s 44
s 5f

DESIGNATION Terret N
CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 3,5
Port : (érig) - ½ érig - couché
Date de Véraison : 31.7.68
Date de Maturité : 2 semaine 30-9.68 (+7)
Pourriture
Pédoncule : L - M - (C) -
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) - 16
BAIE : TG - (G) - M - P - 21x18
disc. - sph - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.
CHARGE :

s 14
s 26
s 36 avec (pépins) - apyrène
s 43 jus : (inc). - coloré
s 56

DESIGNATION : Terret noir
CLOS 13 PLANCHE A RANG 142 SOUCHE
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27-7-66
Date de maturité : 19-9-66
Pourriture : 0
Pédoncule : C +6
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C). 14
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16
disc. - sph. - ell. - ov. légt
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 14
s 28
s 36 avec pépins - apyrène.
s 46 Jus : inc. - coloré.
s 5 6

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Terret noir
Clos 13 Planche A Rang 142 Souche
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 20.9.65 +5
Pourriture 3 10
GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P 18X17
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 15 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 0 disc - (sph). - (ell) lég - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 4
s 4 10 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M- (C)-

Terret noir

Désignation :

Clos Planche 13 Rang A Souche 142

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 11.9.64 +4

Pourriture : 2

GRAPPE : G – (M) 15 – P – L – M – (C.)

Pédoncule : L – M – (C.)

BAIE : TG – (G) 20 x 18 – M – P.

Bl. – Gr – Rs – Rg – (N.) Pgt

Charge :

s 1 20 Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 0 disc. – sph. – (cyl.) – Ov. –

s 3 10 Obov. – cyl. – fus.

s 4 2

s 5 10 avec pépins – ~~apyrène~~

jus : inc. – ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Terret Noir

Clos 13 planche A – Rang 142 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de maturité : 23.9.63 x

Pourriture : 1 +6

GRAPPE – G – (M) – P – L – M – (C) 17

BAIE : TG – G – (M) – P. 18x17

Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge 42

saveur : (s) – m – ar – fox – herb

s 1 14 disc. – sph. – (cil.) – Ov.

Obov. – cyl. – fus.

s 2 4 avec pépins – ~~apyrène~~

s 3 7

s 4 8 jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 10

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 142

Vigueur : 3

Date de maturité : le 12-9-59 P=2

Charge :

s. 1 16

2 7.

3 12

4 5.

5 8.

(M. – le 5-9-1958 Ferro)

Terret noir

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 142

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 9

2 2

3 1

4 7

5 0

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 142

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 11.9.56

s 1 - 1
s 2 - 0
s 3 - 0
s 4 - 3
s 5 - 2

Bi : 3

2e époque

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 142

Vigueur : 3

Date de mâturité : 25-9-57

R Bi : 2

Charge :

s. 1 - 5
2 - 0
3 - 4
4 - 5
5 - 0

3e époque

Année 1957 Terret noir

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 13 A 142 . . .

	Nombre total	DATES							
		18/3	20-3	23/3					
1	3	0	0	2	x				
~~2~~									
3	4	~~14~~	~~2~~ 1	2	x				
4	4	0	0	0					
5	4	0	0	2	x				

IVe D le 23-3-57

Année . 1958 – Terret noir –

N° .... Planche .... Côté .13.A.142........

	Nombre total	DATES							
		31,3	2.4	~~[illegible]~~					
1	6	1	3 x	~~[illegible]~~					
2	4	3	3 x						
3	8	2	4 x						
4	4	3	3 x						
5	6	0	2						

D le 2-4-58. IIIe

Cerret noir

Année 1959

N° .... Planche 13.A.142.... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3	25.3	28.3				
1	7	0	0	1	3				
2	4	1	2	4	4				
3	7	0	0	1	2				
4	6	0	0	0	5				
5	8	0	0	0	4				

D le 28-3-59

Année : 1960

N° Cerret noir . . Planche . 13 A 142 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19-3					
1	12	0	2	6					
2	5	0	3	3					
3	10	2	5	6					
4	8	0	3	3					
5	12	0	1	1		D le 19-3-60 ×			

Année : 1961 Terret noir

Emplacement : 13 A 142

	Nombre total	7.3	10.3	13.3							DATES
1	11 -	0	2	6 .							
2	6	3	6	6 .							
3	15	0	2	10 x							
4	9 .	1	4	7 x							
5	12	1	7	9 x							
6											
7					D-4	11-3	6 1x				
8						+5					
9											
10											

Année 1962 Terret noir

N .... Planche 13 A 142 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6.4	12.4						
1	12.	5	10 x						
2	10 .	5 x	8 x						
3	16	6	12 x						
4	14	5	12 x						
5	10 -	6 x	9 x						

D 4 8.4 12 x +5

Année : 1963

Emplacement ..13 A 142........ Désignation .Terret noir............

	Nombre total	DATES							
		2.4	8.4						
1	15	2	10 x						
2	15	3	7						
3	17	3	10 x						
4	18	0	7						
5	18	2	13 x						

D le 7-4-63 x

+2

Année : 1964

Emplacement .13 A 142....... Désignation .Terret noir.........

	Nombre total	DATES							
		27.3	2.4						
1	~~20~~ 18	2	7						
2	~~30~~ 6	0	4 x						
3	22	1	12 x						
4	30	2	13						
5	20	1	10 x						

D le 2-4-64 x

(+5)

Année : 1965
Emplacement 13A142 Désignation Terret noir

	Nombre total	DATES 1.4	5.4	10.4					
1	15	2	4	9 x					
2	6	4	5 x	6 x					
3	14	0	4	7 x					
4	13	4	8 x	11 x					
5	13	2	6	11 x					

D 6.4.65 x +9

Année : 1966
Emplacement 13A142 Désignation Terret

	Nombre total	DATES 7/3	12.3	16.3					
1	10	0	2	5 x					
2	8	0	4 x	7 x					
3	10	1	3	5 x					
4	10	0	4	9 x					
5	6	0	6 x	6 x					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 13-3-66 X.

Désignation : Teret noir

VASSAL   Planche 13 Côté A N° 142 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

3° f à plages jaunes ~~rouges~~ bronzées

14 MAI 1955

Truel

faible   Pas de bourgeons

N° ordre   28 MAI 1955

Désignation : Terret noir

VASSAL Planche 13 côté A N° 142 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Terret 11-6-57

14-6-56

N° ordre

Désignation : Cenet noir

VASSAL Planche 13 côté 17 N° 142 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ~~7~~ - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch

29.6.56

N° ordre

Désignation : Tenet noir

VASSAL Planche 13 côté H N° 142 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté H N° 142 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

25 JUIL 1960

LKret

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 17 N° 112 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquier

N° d'ordre

Désignation *Terret noir*

VASSAL planche *13* côté *A* N° *142* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Trouquière *19-9-56*

Dénomination ....Terret noir...

Planche ....13...... côté ....A........ Rang ....142.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.1... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
17-12-56

N° d'ordre : . . . . Désignation : Terret noir . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 13. A. 142. : Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - ② - 3.

10 - L_2/L. . . . . ① ②

11 - Lobes . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - ① - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3

Forme : ④ - 5

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Pouget

Formulaire de description 2 / 8
(stade floraison)

Année : 2005 Observateur : TD
Code cépage : **14Mtp5** Code introduction :
Nom introduction : **Terret noir** Emplacement : **Vass2R02s476-480**

Bourgeonnement

oiv 001 **forme** : globuleuse **3** - demi-ouverte **5** - ouverte **7**
oiv 002 **distribution pigmentation anthocyanique** : absente **1** - en liseré **2** - partout **3**.
oiv 003 **intensité pigmentation anthocyanique** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 004 **densité poils couchés** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 005 **densité poils dressés** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

Jeunes feuilles

oiv 051 **couleur face supérieure** (4° feuille détachée) : verte **1** - jaune **2** - plages bronzées **3** - cuivrées rougeâtre sur toute la surface **4**.
oiv 053 **densité poils couchés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 054 **densité poils dressés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 055 **densité poils couchés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 056 **densité poils dressés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil : étalées **1** - en gouttière **2** - autre **3**.
Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible **299** - faible **202** – moyenne **203** - très forte **204**.
Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible **280** - moyenne **200** - très forte **201**.
Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
Couleur face sup. : blanc **205** - fauve roux **206** - carminé **207** - liseré carminé **208** - jaune **209** - plages bronzées ou cuivrées **210** - vertes **212** - autre **213**.
(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée : ....)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil : plan **1** - en gouttière **2** - involuté **3** - révoluté **4** - tourmenté **5**.
Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible **285** - faible **223** - moyenne **224** - très forte **225**.
Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible **284** - moyenne **215** - très forte **216**.
Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible **283** - faible **217** - moyenne **218** - très forte **219**.
Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible **282** - moyenne **215** - très forte **216**.
Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9.**
Couleur face sup. : blanc **226** - fauve roux **227** - carminé **228** - liseré carminé **229** - jaune **230** - plages bronzées ou cuivrées **231** - entièrement bronzées ou cuivrées **232** - vertes **233**.

Formulaire de description 3/8
(stade floraison)

Année : 2005 Observateur : TD
Code cépage : **14Mtp5** Code introduction :
Nom introduction **: Terret noir** Emplacement : **Vass2R02s476-480**

Rameau herbacé

oiv 006 **port** : érigé **1** - demi-érigé **3** - horizontal **5** - demi-retombant **7** - retombant **9**.
oiv 351 **vigueur rameaux** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 007 **couleur face dorsale entrenoeuds** : verte **1** - verte à raies rouges **2** - rouge **3**.
oiv 009 **couleur face dorsale noeuds** : verte **1** - verte à raies rouges **2** - rouge **3**.
oiv 008 **couleur face ventrale entrenoeuds** : verte **1** - verte à raies rouges **2** - rouge **3**.
oiv 010 **couleur face ventrale noeuds** : verte **1** - verte à raies rouges **2** - rouge **3**.

oiv 014 **densité poils couchés entrenoeuds** : nulle ou très faible **1** - moyenne **5** - forte **9**.
oiv 012 **densité poils dressés entrenoeuds** : absence **1** - présence **9**.
oiv 013 **densité poils couchés noeuds** : nulle ou très faible **1** - moyenne **5** - forte **9**.
oiv 011 **densité poils dressés noeuds** : absence **1** - présence **9**.

oiv 015 **pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 016 **distribution vrilles** : discontinue (2 ou moins) **1** - subcontinue ou continue (3 ou plus) **2**.
oiv 017 **longueur vrilles** : très courtes (<10cm) **1** - courtes (15cm) **3** - moyennes (20cm) **5** - longues (25cm) **7** - très longues (>30cm) **9**.

Inflorescence

oiv 151 **sexe de la fleur** : mâle **1** - mâle à hermaphrodite **2** - hermaphrodite **3** - femelle à étamines érigées **4** - femelle à étamines reflexes **5**.

oiv 152 **niveau insertion 1° inflorescence** : jusqu'au 4° noeud **1** - au-delà du 4° noeud **2**.

oiv 153 **nombre inflorescence/rameau** : 1 ou moins **1** - 1,1 à deux **2** - 2,2 à trois **3** - plus de trois **4**.
oiv 155 **inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base :** absence **1** – présence **9**.

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) **1** - faible (11-30%) **3** - moyen (31-50%) **5** - élevé (51-70%) **7** - très élevé (>80%) **9**.

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie **1** - côtelée **2**.

000-10 **Villosité spéciale du rameau herbacé** : épines ou analogues **1** - poils massifs **2** –aucune **3**.

000-21 **Couleur des vrilles** : jaune **1** – rouge clair **2** – rouge foncé **3** – vert **4**

Bouton floral : petit **1** – moyen **2** – gros **3**.

Formulaire de description 4 / 8
(entre stades nouaison et véraison)

Année : 2005 Observateur : TD
Code cépage : **14Mtp5** Code introduction :
Nom introduction : **Terret noir** Emplacement : **Vass2R02s476-480**

Feuille adulte

oiv 065 **taille** : très petite **1** - petite **3** - moyenne **5** - grande **7** - très grande **9**.
oiv 067 **forme du limbe** : cordiforme **1** - cunéiforme **2** - pentagonale **3** - orbiculaire **4** - réniforme **5**.
oiv 068 **nombre de lobes** : feuille entière **1** - trois **2** - cinq **3** - sept **4** - plus de sept **5**.

oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair **3** - vert moyen **5** - vert foncé **7**.
oiv 070 **pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure** : nulle **1** - point pétiolaire rouge **2** - rouge jusque première bifurcation **3** - rouge après première bifurcation **4**.
oiv 071 **pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure** : nulle **1** - point pétiolaire rouge **2** - rouge jusque première bifurcation **3** - rouge après première bifurcation **4**.

oiv 074 **profil** : plan **1** - en gouttière **2** - involuté **3** - révoluté **4** - tourmenté **5**.
oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I ou II) : absente **1** - présente **9**.
oiv 072 **gaufrure limbe** (dépressions entre nervures II ou III) : absente **1** - présente **9**.
oiv 075 **cloqûre face supérieure limbe** (relief entre nervures de dernier ordre) :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 084 **densité poils couchés entre nervures face inférieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 087 **densité poils dressés des nervures face inférieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente **1** - présente **9**.
oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente **1** - présente **9**.

Pétiole

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** :
beaucoup plus court **1** - plus court **3** - égal **5** - plus long **7** - beaucoup plus long **9**.

Autre

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) **1** - faible (11-30%) **3** - moyen (31-50%) **5** - élevé (51-70%) **7** - très élevé (>80%) **9**.

Vassal : **Densité poils couchés limbe face supérieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
Densité poils dressés limbe face supérieure :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 000-06 **Couleur du pétiole** : vert **3** - partiellement coloré **2** - coloré **1**.

[**sinus pétiolaire** : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U–accol.–V / dent = oui-non / dégarni = non-parfois-oui]
[**sinus latéraux** : ouverture = 1-2-3-4 / forme = U-accol.–V / dent = oui-non]
[**dents** : forme = concave-rectiligne-rectiligne&ronde-ronde-crochue / taille = 1-3-5-7-9 / courtes-moy-longues]

Formulaire de description 5 / 8
(stade maturité)

Année : 2005 Observateur : TD
Code cépage : Code introduction : 14Mtp5
Nom introduction : Terret noir Emplacement : **Vass2R02s476-480**

Grappe

oiv 202 **longueur** : très courte (<10 cm) **1** - courte (10-14 cm) **3** - moyenne (14-18 cm) **5** - longue (18-25 cm) **7** - très longue (>25 cm) **9**. Valeur absolue (en cm.) : 18 cm
oiv 203 **largeur** : très étroite (<5 cm) **1** - étroite (5-10 cm) **3** - moyenne (10-15 cm) **5** – large (15-20 cm) **7** - très large (>20 cm) **9**. Valeur absolue (en cm.) : 16 cm
oiv 204 **compacité** : très lâche **1** - lâche **3** - moyenne **5** - compacte **7** - très compacte **9**.
oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<3 cm) **1** - court (3-5 cm) **3** - moyen (5-7 cm) **5** – long (7-10 cm) **7** - très long (>10 cm) **9**.
oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement **1** - moitié **5** - plus de la moitié **7**.
oiv 208 **forme** : cylindrique **1** - conique ou pyramidale **2** – en entonnoir **3**.
oiv 209 **présence d'un aileron** : absent **1** - une à trois ailes **2** - plus de trois ailes **3**.

Baie

oiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) **1** - courte (8-14mm) **3** - moyenne (14-20mm) **5** - longue (20-26mm) **7** - très longue (>26mm) **9**. Valeur absolue (en mm.) : 18 mm
oiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) **1** - étroite (8-14mm) **3** - moyenne (14-20mm) **5** – large (20-26mm) **7** - très large (>26mm) **9**. Valeur absolue (en mm.) : 16 mm
oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme **1** - uniforme **3**.
oiv 223 **forme** : aplatie **1** - arrondie **2** - elliptique **3** - ovoïde **4** - troncovoïde **5** - obovoïde **6** - cylindrique **7** - arquée **8**.
oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune **1** - rose **2** - rouge **3** - gris **4** – rouge violet **5** – bleu noir **6**
oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme **1** - uniforme **2**.
oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince **1** - mince **3** - moyenne **5** - épaisse **7** - très épaisse **9**.
oiv 229 **ombilic** : peu apparent **1** - apparent **2**.

oiv 230 **coloration de la pulpe** : non colorée **1** - colorée **2**.
oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée **1** - coloration faible **3** - coloration moyenne **5** - forte coloration **7** - très forte coloration **9**.
oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse **1** - juteuse **2**.
oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) **3** - moyen (65-75) **5** - élevé (>75) **7**.
oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - élevée **7** - très élevée **9**.
oiv 236 **saveur** : aucune **1** - goût muscat **2** - goût foxé **3** - goût herbacé **4** - autre **5**.

oiv 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) **1** - court (4-8mm) **3** - moyen (8-12mm) **5** - long (12-16mm) **7** - très long (>16mm) **9**.
oiv 240 **séparation du pédicelle** : très facile **1** - facile **3** - moyen **5** - difficile **7** - très difficile **9**.
oiv 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.
oiv 242 **longueur pépins** : très courts **1** - courts **3** - moyens **5** - longs **7** - très longs **9**. 7 mm
oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) **1** - faible (25mg) **3** - moyen (40mg) **5** - élevé (55mg) **7** - très élevé (>65mg) **9**.
oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes **1** - présentes **2**.

Vassal : 000-11 **axe de la rafle de la grappe** : non coloré **2** - coloré **1**.
000-18 **région ombilicale** : déprimée **1** – non déprimée **2**.
Millerandage : nul à très faible **1** – faible **3** – moyen **5** – fort **7** – très fort **9**.